Le informazioni riportate in questo documento si riferiscono alla preparazione necessaria per effettuare l'esame per la ricerca di ossiuri (parassiti intestinali) mediante il test dello scotch (nastro adesivo).

Il paziente deve richiedere al Laboratorio Analisi gli appositi vetrini su cui verrà apposto lo scotch.

IMPORTANTE: si raccomanda che lo scotch utilizzato sia trasparente.

Il prelievo deve essere effettuato la mattina, prima dell'igiene intima.

PREPARAZIONE

1. Divaricare le natiche.
2. Applicare un tratto di scotch lungo come il vetrino sulle pliche anali.
3. Lasciare lo scotch così posizionato per 30 secondi: in questo modo eventuali uova di parassiti, o loro frammenti, presenti sulla zona anale, rimarranno adesi allo scotch.
4. Rimuovere lo scotch e posizionarlo sul vetrino facendolo aderire bene.
5. Consegnare il vetrino al centro prelievi dopo l'accettazione al CUP.

DETECTION OF OXYURIASIS EGGS – Enterobius vericularis – (SCOTCH TAPE TEST)

The information in this document refers to the necessary preparation for the test to detect pinworms (intestinal parasites) using the tape test. The patient should request the appropriate slides from the Laboratory Analysis where the tape will be placed.

IMPORTANT: It is recommended that the tape used be transparent. The sample must be collected in the morning, before intimate hygiene.

PREPARATION:

1. Separate the buttocks.
2. Apply a strip of tape the same length as the slide to the anal folds.
3. Leave the tape in place for 30 seconds so that any eggs or fragments of parasites present in the anal area will adhere to the tape.
4. Remove the tape and place it on the slide, pressing it firmly.
5. Deliver the slide to the sample collection center after registration at the CUP.

DETECCION DE HUEVOS DE OXIURO – Enterobius vermicularis – (SCOTCH TEST)

La información contenida en este documento se refiere a la preparación necesaria para realizar la prueba de búsqueda de oxiuros (parásitos intestinales) mediante la prueba con cinta adhesiva. El paciente debe solicitar al laboratorio los portaobjetos adecuados sobre los que se colocará la cinta.

IMPORTANTE: Se recomienda que la cinta utilizada sea transparente. La muestra debe tomarse por la mañana, antes de la higiene íntima.

PREPARACIÓN:

1. Separar las nalgas.
2. Aplicar un trozo de cinta de la misma longitud que el portaobjeto sobre los pliegues anales.
3. Dejar la cinta en su lugar durante 30 segundos para que los huevos o fragmentos de parásitos en la zona anal se adhieran a la cinta.
4. Retirar la cinta y colocarla en el portaobjetos presionando bien.
5. Entregar el portaobjetos en el centro de extracción tras la aceptación en el CUP.