

Casa di Cura Ambrosiana Spa	Sistema Sanitario Regione Lombardia	Modulo 371	Versione 03	Data 20/10/2014	Documento di riferimento
-----------------------------	-------------------------------------	---------------	----------------	--------------------	--------------------------

PREPARAZIONE

BIOPSIA PROSTATICA TRANS-RETTALE

DESCRIZIONE TECNICA:

La biopsia prostatica ecoguidata trans-rettale consente di prelevare piccoli campioni di tessuto prostatico mediante puntura con ago sottile. Questo ago viene montato su di una sonda ecografica cilindrica, del diametro di circa 2 cm, che viene introdotta delicatamente nel retto.

Questa procedura permette di visualizzare su di uno schermo l'immagine della prostata e la posizione dell'ago durante tutto il trattamento.

Il paziente, a vescica piena, è posto sdraiato sul fianco di sinistra e vengono eseguiti 8 prelievi o più (4 per lobo).

PPREPARAZIONE:

Il paziente deve eseguire:

- esame emocromocitometrico ed uno screening emocoagulativo (per escludere diatesi emorragica)
- esame colturale sulle urine

E' indispensabile portare in visione il risultato di questi test al momento dell'esame.

Se il paziente assume terapie anticoagulanti e/o antiaggreganti (Aspirina, Cardioaspirina, Cardirene, Ibustrin, Cumadin, Sintrom, Ticopidina, Ticklid, Plavix, ecc.) **deve sospendere la terapia in atto alcuni giorni prima dell'esame (in base a quanto indicato in tabella 1) e informare il proprio medico curante per la conferma e per l'eventuale prescrizione di Eparina in sostituzione.**

Il paziente deve segnalare l'eventuale presenza di allergie note a farmaci.

Tre giorni prima dell'esame il paziente dovrà iniziare la **profilassi antibiotica** con Unidrox 600 mg 1 compressa al giorno (se non controindicato). Tale terapia andrà continuata per i successivi 7 giorni. Se il Medico Urologo lo riterrà opportuno, si praticherà Rocefin 1 gr. I.M., 30 minuti prima dell'esame.

Non ci sono limitazioni dietetiche particolari e si raccomanda di **NON venire a digiuno** il giorno della biopsia.

La sera precedente il paziente dovrà effettuare un **clistere** ("Clisma feet", acquistabile in farmacia) ripetendolo la mattina dell'esame alle ore 7.

L'esame viene eseguito in regime ambulatoriale. Il paziente deve presentarsi presso l'ufficio accettazione 40 minuti prima dell'orario programmato per la biopsia presentando due impegnative:

- una recante la dicitura "biopsia prostatica ecoguidata"
- una recante la dicitura "esame istologico da biopsia prostatica"

In fase di prenotazione dell'esame presso l'Accettazione Ricoveri, **verrà consegnato al paziente il consenso informato** che elenca i rischi, i benefici e le possibili complicanze. Eventuali dubbi, domande, ecc... potranno essere chiariti direttamente con il medico urologo il giorno della prestazione.

Dopo l'esame il paziente rimarrà in osservazione per alcune ore.

Dopo la biopsia è possibile rilevare minime quantità di sangue nelle urine e nelle feci per alcuni giorni e nel liquido seminale per circa 2 mesi. E' possibile, anche se rara, la

Casa di Cura Ambrosiana Spa	Sistema Sanitario  Regione Lombardia	Modulo 371	Versione 03	Data 20/10/2014	Documento di riferimento
PREPARAZIONE					

comparsa di infezione della prostata o delle urine che generalmente si risolve in breve tempo con terapia antibiotica.

Sono sconsigliati l'uso della bicicletta ed i rapporti sessuali nei successivi 20 giorni.

E' possibile la comparsa di una ritenzione urinaria acuta che renda necessario il posizionamento di catetere vescicale da tenere alcuni giorni.

La comparsa di sanguinamento continuo ed abbondante e/o la comparsa di febbre elevata e di dolore pelvico devono indurre il paziente a consultare immediatamente il personale medico della nostra Unità Operativa o il Pronto Soccorso territoriale.

Tabella 1

TEMPI DI SOSPENSIONE TERAPIA ANTICOAGULANTE E/O ANTIAGGREGANTE	
FARMACO	TEMPO DI SOSPENSIONE
ASPIRINA	4 giorni prima dell'esame
CARDIOASPIRINA	4 giorni prima dell'esame
CARDIRENE	4 giorni prima dell'esame
IBUSTRIN	8 giorni prima dell'esame
CUMADIN	8 giorni prima dell'esame
SINTROM	8 giorni prima dell'esame
TICOPIDINA (se si assume 1 compressa al dì)	8 giorni prima dell'esame
TICOPIDINA (se si assumono 2 compresse al dì)	15 giorni prima dell'esame
TICKLID (se si assume 1 compressa al dì)	8 giorni prima dell'esame
TICKLID (se si assumono 2 compresse al dì)	15 giorni prima dell'esame
PLAVIX (se si assume 1 compressa al dì)	8 giorni prima dell'esame
PLAVIX (se si assumono 2 compresse al dì)	15 giorni prima dell'esame

E' necessario portare tutta la documentazione pregressa, relativa alla patologia (PSA, esami ematochimici, referti di visite precedenti, ecografie etc.).